

"СОГЛАСОВАНО"

Директор ФБУН НИИ Дезинфекто-  
надзора и контроля потребнадзора  
N. В. Шестопалов  
2011 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор  
ООО "Оборона"  
(Россия, Москва)



И. Е. Палилов  
2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению инсектицидного средства  
"Дохлокс-гель"

Москва – 2011 г.

**Инструкция  
по применению инсектицидного средства  
"Дохлокс-гель"**

Инструкция разработана в ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора взамен Инструкции № 002/04 от 03.09.2004.

Авторы: Костина М.Н., Рысина Т.З., Новикова Э.А.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Инсектицидное средство "Дохлокс-гель" представляет собой гель светло-бежевого цвета. Действующим веществом его является фипронил (0,05%) – высокоактивное соединение из группы фенилпиразолов, обладающее кишечно-контактной активностью. В состав геля входят также консервант, стабилизатор, гелеобразователь, битрекс и пищевые аттрактанты.

1.2. Средство обладает острой инсектицидной активностью для тараканов и муравьев (рыжих домовых и различных видов садовых): полная гибель тараканов наступает через 1-2 суток, муравьев – на 2-3 сутки. Остаточное действие сохраняется 1,5-2 месяца.

1.3. По степени опасности при однократном введении в желудок и нанесении на кожу средство относится к IV классу малоопасных средств по ГОСТ 12.1.007-76. При однократном контакте с кожными покровами не обладает местно-раздражающим действием; при многократном нанесении – установлен слабо-выраженный эффект. Кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действие, не установлено. По зоне острого и подострого биоцидного действия в рекомендуемом режиме применения относится к IV классу малоопасных по Классификации степени опасности средств дезинсекции.

ОБУВ фипронила в воздухе рабочей зоны – 0,1 мг/м<sup>3</sup> – II класс опасности.

1.4. Средство предназначено для уничтожения тараканов и муравьев (рыжих домовых и различных видов садовых) на объектах различных категорий, включая детские, лечебные, пищевые, организациями, занимающиеся дезинфекциейной деятельностью, а также населением в быту.

## 2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА "ДОХЛОКС-ГЕЛЬ"

### 2.1. УНИЧТОЖЕНИЕ ТАРАКАНОВ

2.1.1. Перед обработкой - провести уборку помещения, собрать остатки пищи, крошки, пищевые отходы и другие источники корма. Плотно накрыть емкости с водой, закрыть водопроводные краны, лишив насекомых источников влаги.

2.1.2. Гель тонким слоем вводят из шприца или тубы в трещины в плинтусах, в щели и другие трудно доступные для обработки места, которые могут служить укрытием для тараканов. Обработке подлежат также другие места об-

наружения, возможного обитания или передвижения тараканов: под раковинами, за холодильниками, около ведер или бачков для сбора мусора и пищевых отходов, на нижние полки столов, а также около стояков и труб горячего водоснабжения.

2.1.3. Наносить гель следует пунктирной линией: 2 см геля – 2 см необработанной поверхности. При малой и средней численности тараканов интервалы между полосками геля можно увеличить до 4 см: 2 см геля – 4 см необработанной поверхности.

2.1.4. Гель можно наносить на подложки и размещать его в местах обитания, скопления или передвижения тараканов. Норма расхода 30 мг на подложку при малой и 50 мг – при большой численности из расчета 3-4 подложки на помещение  $\approx 10 \text{ м}^2$ .

2.1.5. Повторные обработки следует проводить не ранее, чем через 4 недели.

2.1.6. Не рекомендуется одновременное использование геля со средствами контактного действия (концентраты эмульсий, смачивающиеся порошки, дусты, средства в аэрозольной упаковке и др.).

## 2.2. УНИЧТОЖЕНИЕ МУРАВЬЕВ

2.2.1. Для уничтожения рыжих домовых муравьев гель по 30 мг помещают на подложки или наносят пунктиром в местах обнаружения или на путях передвижения ("дорожки") насекомых с интервалом 4 см между полосами геля. При высокой численности муравьев интервал между полосами может быть увеличен до 2 см.

2.2.2. Для уничтожения садовых муравьев различных видов, которые, как правило, заползают на нижние этажи домов, коттеджей, веранд, открытых террас, гель наносят не только по периметру помещений, но и снаружи.

2.2.3. Повторяют обработки после появления муравьев.

## 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Избегать контакта средства с кожей; при случайном попадании – обильно смыть водой. Использовать только по назначению.

3.2. После окончания работы со средством - вымыть руки водой с мылом.

3.3. Упаковку уничтожить сразу же после ее использования.

## 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При нарушении рекомендуемых мер предосторожности во время работы случайно может произойти отравление. Пострадавшего немедленно следует вывести на свежий воздух, загрязненную одежду снять.

4.2. Гель, попавший на кожу, осторожно удалить (без втирания) ватным тампоном, после чего кожу обработать 2% раствором пищевой соды, затем промыть теплой водой с мылом.

4.3. При попадании средства в глаза - обильно промыть их под струей воды или 2% раствором пищевой соды в течение 5-10 минут. При раздражении - закапать 30% раствор сульфацила натрия, при болезненности – 2% раствор новокаина.

4.4. При случайном попадании средства в желудок - необходимо выпить несколько стаканов воды, а затем принять 10-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к врачу.

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА

5.1. Транспортирование: допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, гарантирующими сохранность средства и тары, действующими на данном виде транспорта и обеспечивающими защиту средства от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, с Классификационным шифром 6112, № ООН 2588. В аварийных ситуациях - при нарушении целостности упаковки и случайном розливе геля – засыпать его сорбирующими материалом (песок, опилки, ветошь), затем собрать его в специальный контейнер для последующей утилизации, используя спецодежду (комбинезон, фартук клеенчатый, косынка); средства защиты кожи рук (резиновые перчатки) и глаз (герметичные очки ПО-2, ПО-3). Загрязненное место обработать кашицей хлорной извести (1 кг на 10 л воды), а затем смыть обильным количеством воды.

5.2. Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания средства в сточные (поверхностные), подземные воды и канализацию.

5.3. Хранить средство следует в сухом, крытом, проветриваемом складском помещении в закрытой упаковке при температуре не ниже нуля и не выше плюс 40°C.

5.4. Упаковывается средство по 20 или 50 г в шприцы или тубы.

5.5. Срок годности – 2 года в невскрытой упаковке изготовителя.

## 6 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

В соответствии с требованиями нормативно-технической документации ТУ 9392-006-69007441-2011 инсектицидное средство "Дохлокс-гель" должно соответствовать показателям и нормам, указанным в таблице.

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1.	Внешний вид	Гель светло-бежевого цвета
2.	Массовая доля фипронила по 100% веществу, %	0,050 ± 0,005

6.2. Определение внешнего вида средства.

Внешний вид средства определяется визуальным осмотром представительной пробы.

### 6.3 Измерение массовой доли фипронила

Массовую долю фипронила в средстве измеряют газохроматографическим методом с применением пламенно-ионизационного детектора, хроматографирования в режиме программирования температуры и абсолютной градуировки.

Числовые значения результата измерений массовой доли округляют до наименьшего разряда, указанного в нормативе п.6.1.

Результаты взвешивания средства и аналитического стандарта записывают в граммах с точностью до четвертого десятичного знака.

Расчет ведут по площадям хроматографических пиков фипронила в рабочей градуировочной смеси и испытуемом растворе.

### Средства измерения, реактивы, вспомогательное оборудование

- Аналитический газовый хроматограф «Кристалл 2000М», снабженный пламенно-ионизационным детектором, стандартной колонкой длиной 1м, программой управления оборудованием и обработки хроматографических данных на базе персонального компьютера

- Микрошприц типа МШ-10

- Весы лабораторные общего назначения 2 класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г

- Колбы мерные вместимостью 25 мл

- Пипетки вместимостью 5 мл

- Пробирки центрифужные вместимостью 10 мл

- Фипронил - аналитический стандарт или технический продукт с установленным содержанием основного вещества (импорт, CAS №120068-37-3)

- Сорбент - силанизированный хроматон N-AW-DMCS (0,20 – 0,25 мм), пропитанный 5% SE-30

- Ацетон "ч.д.а."

- Ацетонитрил "ч.д.а."

- Азот газообразный

- Водород технический, сжатый в баллоне или от генератора водорода ГВЧ

- Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора

### Приготовление градуировочных смесей

Основную градуировочную смесь приготавливают в мерной колбе вместимостью 25 мл растворением 0,05 г фипронила в ацетоне.

Для приготовления рабочей градуировочной смеси фипронила в мерную колбу вместимостью 25 мл дозируют 5 мл основной градуировочной смеси, добавляют до калибровочной метки ацетонитрил и тщательно перемешивают.

2 мкл рабочей градуировочной смеси вводят в хроматограф не менее двух раз и из полученных хроматограмм определяют время удерживания и площадь хроматографического пика фипронила в рабочей градуировочной смеси.

## Условия работы хроматографа

Объемная скорость газа-носителя	20 см <sup>3</sup> /мин.
Объемная скорость водорода	25 см <sup>3</sup> /мин.
Объемная скорость воздуха	250 см <sup>3</sup> /мин.
Температура испарителя	240°C
Температура детектора	270°C
Температура колонки, программа:	
140°C в течение 3 мин. → 160°C, скорость нагрева 10°C/мин.;	
изотерма при 160°C в течение 3 мин. → 230°C, скорость нагрева 10°C/мин.;	
изотерма при 230°C в течение 10 мин. → 240°C, скорость нагрева 5°C/мин.	
Объем пробы, дозируемой в хроматограф 2 мкл.	
Примерное время удерживания фипронила 18,4 мин.	

## Выполнение измерений

Около 2,5 г средства, взвешенного с аналитической точностью, помещают в центрифужную пробирку вместимостью 10 мл, добавляют 1 мл ацетона и перемешивают с помощью стеклянной палочки до получения раствора взвеси. Затем в пробирку добавляют 2 мл ацетонитрила, встряхивают, выдерживают в течение 15-20 мин. и центрифугируют. Отбирают 2 мкл прозрачного раствора над осадком и дозируют в хроматограф. Из хроматограмм вычисляют площадь хроматографического пика фипронила.

## Обработка результатов измерений

Массовую долю фипронила в средстве ( $X_i$ , %) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{C_{r.c} * S * a * V}{S_{r.c} * m}$$

где  $S$ , ( $S_{r.c}$ ) - площадь хроматографического пика фипронила в испытуемом растворе, (рабочей градуировочной смеси)

$C_{r.c}$  - массовая концентрация фипронила в рабочей градуировочной смеси, мг/мл;

$a$  - массовая доля основного вещества в аналитическом стандарте фипронила, %;

$V$  - объем испытуемого раствора, мл;

$m$  - масса испытуемой пробы, мг.

За результат измерений принимают среднее арифметическое значение двух параллельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемого значения, равного 0,007% при доверительной вероятности 0,95.

При превышении допустимого расхождения измерения повторяют и за результат принимают среднее значение всех параллельных измерений. Границы

относительной суммарной погрешности результата измерений не должны превышать  $\pm 10\%$  при доверительной вероятности  $P=0,95$ .